

www.drghaisari.com



جراحی زیبایی چانه

راهنمای بیماران جراحی پلاستیک بینی و صورت



www.drghaisari.com

حد عادی باشد بخش میانی صورت تورفته به نظر رسیده و زیبایی و توازن صورت و کردن از بین می رود.

علاوه بر این چانه به علت قرار گرفتن در منتهی الیه تحتانی صورت در شکل دادن فرم صورت (Facial countour) و تناسب بخشیدن قسمتهای مختلف صورت نظیر پیشانی و بینی (در نیمرخ) و توازن مناسب و زیبا یا گونه ها (در رخ) بسیار تعیین کننده و مؤثر است. امروزه داشتن چانه برجسته و متناسب با سایر اجزا صورت در بین ستارگان سینمایی و مدل‌های Fashion بسیار متداول است.

نحوه جراحی چانه

• بیماری که دارای چانه بزرگ هستند، لیکن اختلال دندانی نداشته و بزرگی چانه آنها به علت جلو آمدن فک تحتانی نمی باشد تنها راه چاره کاهش ارتفاع و حجم استخوان ناحیه چانه با استفاده از روش جراحی از طریق داخل دهان و یا ناحیه پوست زیر چانه می باشد که با برداشتن یک قطعه استخوان میانی چانه سبب می‌گردد تا با کم شدن ارتفاع و حجم استخوان چانه، به میزان مناسب، فرد توازن و هماهنگی صورت خود را بازیابد و چهره ظریف تری پیدا نماید.

• بیماری که دارای چانه کوچکتر از حد طبیعی بوده، (در نیمرخ چهره) بخش تحتانی صورت بسیار عقب تر دیده می شود. که موجب بیرون زدگی و برجستگی بخش میانی صورت و بینی می‌گردد. که این دسته از بیماران غالباً برای اعمال جراحی بینی مراجعه می نمایند و خواهان هر قدر کوچکتر شدن خود برای اصلاح بیرون زدگی بینی از صورت می باشند در این دسته از افراد هر قدر هم با کوچک کردن بینی قصد اصلاح عیب فوق را داشته باشیم موفق نخواهیم شد و بهتر است با آنالیز صحیح و تشریح کامل صورت، بیمار را از مشکلات خویش آگاه سازیم و ضمن اصلاح مناسب بینی با انجام جراحی تکمیلی چانه و اصلاح زاویه تحتانی صورت چهره موزون و متناسب برای بیمار خود ایجاد نماییم در روش متداول در اصلاح چانه های کوچک عبارتند از:

الف: عمل ژئوپلاستی: در این روش چنانچه استخوان فک تحتانی و چانه از اندازه و ابعاد کافی برخوردار باشد و فقط رشد آن به طرف جلو متوقف شده باشد، می توان با جدا کردن بخش تحتانی استخوان چانه از فک تحتانی و جلو آوردن آن به میزان کافی و متناسب با صورت و سپس ثابت کردن آن در محل جدید برای همیشه چانه متناسب با صورت ایجاد نمود.

ب: پروتز چانه: در افرادی که چانه و فک تحتانی آنها فاقد حجم و اندازه مورد نیاز جراح است و علاوه بر عقب بودن استخوان چانه، فک تحتانی نیز کوچک می باشد و همچنین افرادی که حاضر به انجام جراحی روی استخوان فک تحتانی نیستند، و روش ساده تر را ترجیح می دهند، استفاده از پروتزهای متنوع و گوناگون چانه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه با پیشرفت علم مهندسی پزشکی تهیه پروتزهای مصنوعی گوناگون با سایزها و فرم های متنوع، تحول عظیمی در جراحی مدون صورت پدید آورده است. این پروتزها

جراحی زیبایی چانه

چانه در ۱/۳ تحتانی صورت نقش بسیار مهمی در ایجاد توازن و زیبایی صورت دارد. خصوصاً نقش آن در نیمرخ و سه رخ فرد بسیار تعیین کننده می باشد.

از زمانهای قدیم جراحان پلاستیک صورت که اقدام به عمل زیبایی بینی نموده اند، رابطه تعیین کننده چانه و بینی و نقش آن در هماهنگی صورت و افاق بوده اند. لذا تلاش بسیاری به عمل آورده اند که بتوانند با اصلاح چانه ارتباط خوبی بین زوایای صورت به وجود آورند. فک تحتانی صورت که چانه عضو برجسته در آن می باشد مشتمل است بر لب پایین نسج نرم و استخوان چانه و استخوان فک تحتانی و از نظر ظاهری از شکاف بین لبها شروع و تا نقطه مرکزی چانه امتداد دارد و زاویه صورت را با گردن تشکیل می دهد لذا چنانچه این قسمت کوچک و تکامل نیافته باشد، سبب می گردد که بخش میانی صورت و خصوصاً بینی بزرگتر و برجسته تر به نظر آید و به علت صاف شدن زاویه چانه و گردن، فرد دارای غیبب بشود و بالعکس چنانچه چانه و فک بیمار بزرگتر از

امروزه از موادی ساخته می‌شوند که اصطلاحاً با بدن سازگار یا Biocomptibel می‌باشند و لذا تنها با جراحی مختصری بر روی نسج نرم ناحیه چانه از طریق داخل دهان و بدون نیاز به هرگونه دستکاری جراحی روی استخوان‌های فک می‌توان چانه متناسب و زیبا ایجاد نمود. این گونه پروتزها به شکل یک چانه طبیعی ظاهر می‌شود و بعد از عمل غیر قابل تشخیص از چانه خود فرد می‌باشند و معمولاً فاقد عارضه مهمی می‌باشد و در هر زمان که نیاز باشد قابل خارج کردن است. عمل جراحی چانه با بی‌حسی موضعی و یا با استفاده از داروی آرامبخش بدون نیاز به بیهوشی عمومی قابل انجام است و بعد از عمل ضروری است موارد زیر رعایت شود:

- ۵-۶ ساعت اول غذا میل نکنید.
- ۷۲ ساعت اول موقع صرف غذا با استفاده از قاشق مربا خوری، غذا را پشت دندانهای پیشین خالی کنید.
- ۵ روز اول بعد از هر نوبت غذا محل عمل (داخل دهان) را با سرم شستشو نمائید.
- از خندیدن زیاد، بلند حرف زدن در طی ۳-۵ روز بعد از عمل پرهیز نمائید.
- در طی پنج روز اول بوسیله چسب پروتز در محل ثابت می‌شود لذا از دستکاری آن بپرهیزید.
- معمولاً پس از یک هفته مراحل مراقبت و بهبودی شما تمام شده و به زندگی عادی برمی‌گردید.



دکتر لیصری


بورڈ تخصصی گوش، حلق و بینی
جراحی پلاسٹیک، بینی و صورت
www.drghaisari.com

جراحی زیبایی چانه

9

انحصاری بیمارستان، جراحی پلاسٹیک، بینی و صورت

- ◊ ولیعصر شمالی
- ◊ باغ فردوس (پروج فردوس)
- ◊ واحد ۱۹
- ◊ تلفن: ۲۲۷۰۶۵۹۶
- ◊ ۲۲۷۰۶۵۹۵



Dr. Ghaisari

